

XEDALIG-Ca

CONCIME CE - Formiato di calcio con rame (Cu) e zinco (Zn)
MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI (WG)

COMPOSIZIONE

Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua.....	34%
Formiato.....	56%
Zinco (Zn) solubile in acqua.....	0,5%
Rame (Cu) solubile in acqua.....	0,5%

Peso netto: 1kg **Lotto N.** vedi corpo della confezione.

Fabbricante: XEDA INTERNATIONAL S.A.
Zone Artisanale La Crau, 2 - 13670 St. Andiol (Francia)

Distribuito da: XEDA ITALIA S.r.l.
Via F. Guarini, 15 - 47121 Forlì (FC) - Tel. 0543 780600

UFI: STSR-90KO-THOT-UEWS

Contiene: CALCIO FORMIATO,
SOLFATO DI RAME PENTAIDRATO

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H412 Nocivo per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata.



PERICOLO

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P280 Proteggere gli occhi e il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P273 Non disperdere nell'ambiente. P501 Smaltire il contenuto e il recipiente in conformità alla regolamentazione locale.

CARATTERISTICHE

XEDALIG-Ca è un concime a base di Calcio formiato formulato in un innovativo microgranulo che permette un'idrosolubilità superiore al 99% e un notevole vantaggio nei dosaggi rispetto alle polveri. Il formiato è un sale derivante dall'acido formico in grado di veicolare efficientemente il Calcio all'interno della pianta rendendolo più disponibile. Questa formulazione è particolarmente attiva nel curare rapidamente e prevenire le fisiopatie dovute a carenza di Calcio (butteratura amara delle pomacee, marciume apicale delle solanacee, disseccamento dei margini fogliari degli ortaggi a foglia, secume fisiologico del melone) e migliorare la consistenza dei tessuti verdi e dei frutti, prolungandone la shelf life. La speciale formulazione rende il prodotto molto selettivo nei confronti della vegetazione trattata.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURA	DOSI	MODALITÀ D'IMPIEGO
Vite	2-2,5 Kg/Ha	Trattare ogni 10-15 giorni da fioritura a ingrossamento frutto
Ortaggi	2-2,5 Kg/Ha	Trattare ogni 7-15 giorni da allegazione a ingrossamento frutto
Ortaggi a foglia	2-2,5 Kg/Ha	Trattare ogni 10-15 giorni per tutto il ciclo
Olivo	2-2,5 Kg/Ha	Trattare ogni 7-15 giorni fino alla scomparsa dei sintomi
Pomacee, drupacee, actinidia, agrumi, frutti a guccio	2-2,5 Kg/Ha	Trattare ogni 10-15 giorni da fioritura a ingrossamento frutto
Floreali e ornamentali	200-250 gr/hl	Trattare ogni 7-15 giorni fino alla scomparsa dei sintomi

AVVERTENZE

Per uso professionale. Evitare di miscelare con prodotti contenente Zolfo. Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE. EVITARE IL CONTATTO CON GLI OCCHI E CON LA PELLE.