

FERTIL HUMIC I

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
ESTRATTI UMICI DA LEONARDITE

AGITARE PRIMA
DELL'USO

 **XEDA** ITALIA s.r.l.
Socio unico XEDA International s.p.a.
bioprotezione di qualità

Peso netto: **Kg 5**

FERTIL HUMIC L

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA. ESTRATTI UMICI DA LEONARDITE.

Sostanza organica sul tal quale.....	14 %
Sostanza organica sulla sostanza secca.....	65 %
Sostanza organica umificata in percentuale su sostanza organica.....	87 %
Azoto (N) organico sulla sostanza secca.....	0,6 %
Rapporto C/N	62
Mezzo estraente: KOH.	

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie. Conservare a temperatura compresa tra 15 e 35°C. In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è costituito dalla parte più nobile degli acidi umici, dalla frazione, che manifesta nel modo migliore le ottime caratteristiche di questi componenti organici naturali. La loro struttura di tipo colloidale consente di rendere la massima disponibilità dei vari elementi nutritivi somministrati alle piante o presenti nel terreno e la loro capacità di esaltare l'attività dei fattori di crescita così da rendere consigliabile l'impiego sul seme e sull'apparato radicale delle piante prima del trapianto. Per via fogliare il prodotto esplica un'ottima azione veicolante, rendendo più penetrabile la membrana delle cellule, favorendo l'assorbimento e la circolazione dei vari principi nutritivi.

FERTIL HUMIC L:

- MIGLIORA IL GRADO DI ASSIMILABILITÀ DEGLI ELEMENTI MINERALI NEL TERRENO
- FORMA, CON I METALLI, ALCUNI ELEMENTI CHELANTI CHE SFUGGONO ALL'AZIONE BLOCCANTE DEL TERRENO
- RIDUCE I PROCESSI DI INSOLUBILIZZAZIONE (PARTICOLARMENTE SU FOSFORO E FERRO)
- STIMOLA L'APPARATO RADICALE, FAVORISCE LA GERMINAZIONE DEI SEMI
- RIDUCE GLI STRESS IDRICI E TERMICI NEL TERRENO
- MIGLIORA LE CARATTERISTICHE PRODUTTIVE E QUALITATIVE DELLE COLTURE.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO:

COLTURA	PERIODO DI APPLICAZIONE	CONCIMAZIONE fogliare g/100 lt.	FERTIRRIGAZIONE in serra kg/1000 mq.	pieno campo kg/ha
Ortaggi, Fragola	Da suddividere prima e dopo il trapianto	100	-	-
	In post-trapianto per favorire la radicazione	-	1-2	-
	Da suddividere in 3-4 applicazioni da inizio allegagione a intervalli di 10 giorni.	-	-	10-15
Vite	Dalla ripresa vegetativa effettuare 3-4 trattamenti	120		15-20
Agrumi	Alla ripresa vegetativa nella fase di allegagione. Ingrossamento frutto	120		15-20
Drupacee, Melo, Pero	Dalla ripresa vegetativa effettuare 3-4 trattamenti	120		15-20
Olivo	Prima della fioritura e ingrossamento frutti	120		10-15
Colture ornamentali Floricole	Al trapianto nelle fasi successive 3-4 trattamenti	100	2-4	15-20
Vivai	Durante la fase iniziale della crescita 2-3 trattamenti	100	1-2	10-15
Colture erbacee Industriali	Durante lo sviluppo intervenire ogni 15-20 giorni	120		

AVVERTENZE

AGITARE PRIMA DELL'USO. Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi indicate. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

ATTENZIONE CONSERVARE IN LUOGO PROTETTO, AL RIPARO DAI RAGGI SOLARI E INACCESSIBILE AI BAMBINI.

Non disperdere il contenitore nell'ambiente.

Fabbricante:

XEDA INTERNATIONAL S.A.

Zone Artisanale Le Crau 2 - 13670 St.Andiol - Francia

Distribuito da:

XEDA Italia srl

Via F. Guarini, 15 - 47121 Forlì (FC)

Tel. +39 0543 780600 - Fax +39 0543 473018

www.xeda.it - info@xeda.it

Lotto N° XXXX

Peso netto **5 Kg**